

硝子体手術 (様)

	手術前	手術当日		手術後	2日から14日目			
	1日前	当日		1日後	2日後～12日後	13日後	14日後	
		術前	術後					
説明	 入院診療計画書・手術同意書・入院誓約書・ベッド端末使用の同意書を看護師に提出してください。  左手にネームバンドを装着します。  メオガード(度付きの眼鏡も可)やテープの購入を確認します。		 手術後はガーゼの眼帯を装着します	 医師の指示があるまで眼帯を付けます				ネームバンドを除去します。
	 手術翌日から開始の点眼薬(ベガモックス、ネバリンデロン、アトロピン、ミドリンP)の説明をします						 退院後の生活の注意点について説明します	
	 手術予定時間、点眼開始時間、手術前後のスケジュール、注意事項の説明をします。		 夕からファロムの内服薬を飲んで下さい。(朝・昼・夕毎食後1錠です)飲みきり終了です。					
検査								
処置		 検査衣に着替えていただきます。  検査着に看護師が術眼札を付けます。  手術室に行く前には、義歯を外して下さい  車椅子で手術室に行きます。		 メオガード2週間装着していただきます。(夜間はカッペへ変更してください。)				
処方薬剤								
点眼	 術眼ベガモックス点眼しているか確認します。1日4回(朝・昼・夕・寝る前)	 術目、朝ベガモックス点眼をしてください。		 診察後より、術目ベガモックス点眼を開始してください。1日4回(朝・昼・夕・寝る前)				
				 診察後より、術眼ネバナックの点眼を開始してください。1日3回(朝・昼・夕)				
				 診察後より、術眼リンデロンの点眼を開始してください。				
				 診察後より、術眼ミドリンPの点眼を開始してください。  術眼アトロピンの点眼を開始してください。				
点滴		 手術前に点滴をします。手術終了後に点滴は抜針します。						
食事		 昼食は絶食です	 手術1時間後より飲食可能です。					
薬剤		 術前点眼は看護師が5分おきに術前点眼をしにきます。(12:40～開始します)						
安静	 安静の制限はありません。	 安静の制限はありません。	 手術後は両眼を閉眼し、仰向けで1時間安静にして下さい。  指示により腹臥位マットを使用して、腹臥位の姿勢をとっていただく事があります。(中止の指示がでるまで)  術後はテレビ禁止です。					
清潔			 入浴・シャワーしないで下さい。	 首から下のみシャワー出来ます。手術翌日～3日目まで目を濡らさないで下さい。				