

| ステップ名称 | 準備期間 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 2日前 | 1日前 | 前夜 | 前夜 | 前夜 | 1日後 | 2日後 | 3日後 | 4日後 | 5日後 | 6日後 | 7日後 | 8日後 | 9日後 | 10日後 |
| 達成目標 | <p>■手術前後の不安を軽減し手術に臨める ■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成目標 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 注意事項 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 食事 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 注射 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 検査 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 理学療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 心理療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄養 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 理学療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 心理療法 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| 栄養 | <p>■術後バイタルの安定 ■悪夢・嘔吐・発汗などの二次的合併症の出現がない ■術中や術後がなくなり安全に入院生活が送れる</p> | | | | | | | | | | | | | | |