

ステップ名称		手術当日	
		基準日	
		術前	術後
達成目標		■不安なく手術を受けることができる。 自己点眼を指導し、感染予防や異常の早期発見に努める。	
達成目標			
注意事項			
サイン	深夜		
	日勤		
	準夜		
投薬	オーダー	 術目モキシフロキサシン点眼 (朝) モキシフロキサシン点眼液0.5%処方 確	
		 看護師が5分おきに術前点眼 をし にきます。 手術1. 2・3・4例目は12:45～ スタ ート	
注射	オーダー		
検査	オーダー		
処置	オーダー	 検査衣に着替えていただきま す。 車椅子で手術室に行きます	 退院前にガーゼを外します
食事	新規項目		
指導			
安静度			
清潔		 入浴・シャワーしないで下さ い。	 首から下のみシャワー出来ま す。 手術翌日～3日目まで目を濡
確認・説明			
活動		 安静の制限はありません。	 手術後は仰向けで1時間安静 にし て下さい。 手術1時間後より飲食できま す。
観察			 バソレーターテープ貼用患 者：婦 室後血圧180/ mmHg以下であ る
文書			 入院前から緑内障の点眼をしている 方 は指薬がない限り続行 退院通知
コメント		 入院診療計画書、承諾書受け 取り 確認 持参薬は続行	
			当日は帰宅後、夕、寝る前に点眼し てください 翌日から朝 昼 夕 眠前 に点眼をし
			ネームバンド除去 次回受診予約票を渡す
			 退院確定