



















発行日:

		1日前	当日 検査前
食事		 塩分制限の病院食を食べていただきます。	 (朝or昼)は半分くらい食べてください。水分はお飲みいただけます。(水、お茶など)
内服薬	1	 ワーファリンは検査の3日前から休薬していただきます。	 食事の量にかかわらず糖尿病薬は中止、インシュリンは朝、昼は半量打ちます。他の薬は服用してください。
	2	 よく眠れるように眠前にレンドルミン(睡眠薬)を服用していただきます。	 検査前にセルシン(精神安定剤)を服薬していただきます。
注射	1		 左腕から点滴を開始します。
検査	1	 心臓の検査を受けていただく場合があります。	 糖尿のあるかたは朝・昼・夕・出棟前の血糖を測定します。
処置	1	 同意書、持参薬、問診票の提出及び確認をさせていただきます。	 病衣に着替えていただきます。
	2	 オリエンテーションを行います。	 義歯やアクセサリー、化粧などはとってください。
	3	 足の甲に印をつけます。	 尿の管を入れる場合があります。
	4	 剃毛を行う場合があります。	
	5	 デスポブルーパンツを購入してください(売店にて販売)。	
安静度	 医師の指示範囲内で自由です。	 車いす(またはベッド)でカテーテル室へ移動します。安定剤を服用した後は歩行できません。	
清潔	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。		
注意事項		 急患その他の事情により遅れる場合があります。	

		当日 検査後	翌日
食事		 水分をよく飲んでください。1時間後食事ができます。	 塩分制限の病院食を食べていただきます。
内服薬	1	 糖尿のあるかたは夕より糖尿病薬、インシュリンを開始します。他の薬も服用してください。ワーファリンや抗血小板薬は医師の指示により開始します。	
注射	1	 点滴をした状態です。4～5時間後点滴終了です。	
検査	1	 糖尿のあるかたは血糖を測定します。  帰室後すぐに心電図をとります。(治療された方のみ)	 検査翌日に採血、心電図検査があります。(治療された方のみ)
処置	1	 帰室後モニターを装着します。(治療された方のみ)	 穿刺部のテープをはがします。傷口の状態を確認します。退院の許可が出た場合は手続きをします。
	2	 ベッドで自室(治療された方は観察室)に戻ります。仰向けでベッド上安静です。尿の管を入れた方は入ったままです。排泄もベッド上です。	
ビン固定		 横向きにはなれません。右足を曲げないでください。	
		 4時間後足の固定をはずします。横向きが可能です。右足を曲げることができます。	
アンギオシール		 帰室後1時間は右足を曲げないでください。横向きになれます。  1～4時間はギヤジアップ(45°)が可能です。	 注意事項があります。パンフレットをお渡しします。
安静度		 5時間後尿の管を抜きます。トイレ歩行が可能です。	 検査のみの方は原則自由、治療された方は階段は使用できません。医師の指示に従ってください。
清潔			 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。
注意事項		 足の付け根に管(シース)が入ったままの場合もあります。その場合は安静時間が延長されます。	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。