

発行日:

		1日前	当日 検査前
食事		 塩分制限の病院食を食べていただきます。	 (朝or昼)は半分くらい食べてください。水分はお飲みいただけます。(水、お茶など)
内服薬	1	 ワーファリンは検査の3日前から休薬していただきます。	 食事の量にかかわらず糖尿病薬は中止、インシュリンは朝、昼は半量打ちます。他の薬は服用してください。
	2	 よく眠れるように眠前にレンドルミン(睡眠薬)を服用していただきます。	 検査前にセルシン(精神安定剤)を服薬していただきます。
注射			 植込みと同側の腕から点滴を開始します。
検査		 心臓の検査を受けていただく場合があります。	 糖尿のあるかたは朝・昼・夕・出棟前の血糖を測定します。
処置	1	 同意書、持参薬、問診票の提出及び確認をさせていただきます。	 病衣に着替えていただきます。上半身は病衣のみでズボンなどは履いていただいて結構です。
	2	 オリエンテーションを行います。	 義歯やアクセサリ、化粧などはとってください。
	3	 心電図モニターを装着します。	 尿の管を入れる場合があります。
安静度		 医師の指示範囲内で自由です。	 車いす(またはベッド)でカテーテル室へ移動します。安定剤を服用した後は歩行できません。
清潔		 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。	
注意事項		 バストバンドは売店で自費購入です。大きめのサイズを購入してください。(電池交換の際は不要です)	 急患その他の事情により遅れる場合があります。

発行日:

		当日 検査後	翌日
食事		 水分をよく飲んでください。1時間後食事ができます。	 塩分制限の病院食を食べていただきます。
内服薬	1	 糖尿のあるかたは夕より糖尿病薬、インシュリンを開始します。他の薬も服用してください。ワーファリンや抗血小板薬は医師の指示により開始します。	
	注射	1  点滴をした状態です。帰室後抗生剤の点滴があります。4～5時間後点滴終了です。	 抗生剤の点滴が2回あります。
検査		1  糖尿のあるかたは血糖を測定します。	 手術翌日に採血、心電図、胸部レントゲン検査があります。
処置	1	 腕をバスタバンドで固定します。	 バスタバンドをはずしません。
	2	 帰室後モニターを装着します。	 固定テープをはずしません。以後、消毒は不要です。
	3		
安静度		 ベッドで自室に戻ります。	 朝6時からトイレ歩行できます。
清潔			
注意事項			 植え込んだ方の手は挙げないでください。

2日目以降は心エコーなどの検査があります。

約1週間後に傷口の抜糸を行います。

入院期間中に臨床工学技士より説明があります。

ペースメーカー手帳をお渡しします。