

カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)を受けられる

様 ①

発行日: 2025年9月11日

	1日前	当日 検査前
食事	 病院食を食べていただきます。	 午前予定の場合は朝食は絶食、昼から食事が再開になります。 午後予定の場合は朝・昼絶食、夕食はから再開になります。 ※検査1時間前から飲水も中止です。
内服薬	 ワーファリンは検査の3日前から休薬していただきます。 (月 日～)	 食事の量にかかわらず糖尿病薬は中止、インシュリンは朝、昼は半量打ちます。他の薬は服用してください。
確認	 同意書、持参薬、問診票の提出及び確認をさせていただきます。	
注射		 左腕から点滴を開始します。
検査	 心臓の検査を受けていただく場合があります。	 糖尿のあるかたは朝・昼・夕・出棟前の血糖を測定します。
処置	 オリエンテーションを行います。  足の甲に印をつけます。  剃毛を行います。  デイスホブルーパンツを購入してください(売店にて販売¥251)。 	 手術着に着替えていただきます。下はブルーパンツもしくはオムツ着用し、ズボンや靴下は着用できません。  義歯やアクセサリ、化粧などはとってください。貴重品は鍵のかかるところにに入れてください。  尿の管は、検査中に眠る場合は検査室で入れます。検査中眠らない場合は病棟で入れてから検査室に行きます。
安静度	 棟内もしくは院内フリーです。病棟外に出られる時には詰所に声をかけてください。	 車いす(またはベッド)でカテーテル室へ移動します。
清潔	 シャワー、入浴が可能です。	 シャワー、入浴はできません。
注意事項		 急患その他の事情により遅れる場合があります。

カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)を受けられる

様 ②

発行日: 2025年9月11日

	当日 検査後	翌日
食事	 水分をよく飲んでください。 2時間後から食事と飲水ができます。	 病院食を食べていただきます。
内服薬	 糖尿病のある方は夕から糖尿病薬とインスリンが再開です。 他の薬も服用してください。 ワーファリンや抗血小板薬は医師の指示により開始します。	 医師から指示が出ている薬を服用していただきます。
注射	 点滴をした状態です。	 点滴の管を抜きます。
検査	 糖尿のあるかたは血糖を測定します。 帰室後すぐに心電図、心エコー検査があります。	 検査翌日に採血、心電図、心エコー検査があります。 睡眠時Spo2検査があります。
処置	 ベッドで病室に戻ります。状態に応じてHCUで観察をすることもあります。穿刺部位を圧迫固定した状態で帰室します。仰向けでベッド上安静です。横向きにはなれません。足を曲げないでください。尿の管は入ったままです。排泄もベッド上です。  4時間後に足の固定をはずします。横向きが可能です。足を曲げることができます。  5時間後に尿の管を抜きます。トイレ歩行が可能です。  出血がある場合圧迫が延長される場合もあります。	 穿刺部のテープをはがします。傷口の状態を確認します。
安静度	 カテーテル後はベッドで移動します。ベッド上安静です。安静が解除されれば歩行が可能と	 医師の指示に従ってください。
清潔	 シャワー浴はできません。	 医師の指示があればシャワー、入浴が可能です。
注意事項	 ワーファリン内服中であれば足の固定を外すのは9時間後となります。	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。