

慢性硬膜下血腫の手術を受けられる

様 ①

発行日:

	1日前	当日 術前	当日 術中	当日 術後	1日後
食事	 夕食が終わったら絶食になります。深夜0時からは水分も飲めません。	 手術前は絶飲食です。水1滴も飲めません。		 手術後は翌日のCTを確認するまで絶飲食です。	 頭部CT確認後より食事や飲水が可能になります。
内服薬	1  抗血小板薬は検査の3日前から休薬していただきます。抗凝固薬は検査の1週間前から休薬していただきます。	 食事の量にかかわらず糖尿病薬は中止、インスリンは朝、昼は半量打ちます。他の薬は服用してください。		 糖尿のあるかたはタより糖尿病薬、インスリンを開始します。他の薬も服用してください。ワーファリンや抗血小板薬は医師の指示により開始します。	
注射	1  基本的には左腕から点滴を開始します。	 手術中に抗生剤を使用します。		 点滴が繋がった状態です。抗生剤の点滴もあります。	 点滴が繋がった状態です。1日2回抗生剤の点滴があります。点滴の機械も使用します。
検査	1  外来で済んでいない検査を受けていただく場合があります。			 糖尿のあるかたは血糖を測定します。	 採血があります。
	2				 頭部CTがあります。
処置	1  同意書、持参薬、問診票の提出及び確認をさせていただきます。	 術衣に着替えていただきます。		 酸素や心電図モニターを装着します。点滴の機械も使用します。	 酸素や心電図モニターを装着していますが、主治医の許可があれば除去します。
	2  パンフレットに沿って、入院時・術前のオリエンテーションを行います。	 義歯やアクセサリ、化粧などはとってください。		 尿の管は入ったままです。	 尿の管は主治医の許可が出れば抜去します。
	3  手術室の看護師と、術後にHCUに入室するため、HCUから看護師が来室し術前オリエンテーションを行います。	 手術室で尿の管を入れます。		 帰室後2時間までは、1時間ごとに血圧を測ります。	 一般病棟では1日に4回血圧などを測ります。
	4  HCU入室時に必要な入院セットの説明をします。				 頭部CT撮影後に主治医の判断でドレーンを抜去します。
安静度	 医師の指示範囲内で自由です。	 術前は室内で待機していただき。手術室へは車椅子で行きます。家族の方はHCUの家族待合室へ案内します。		 帰室後はご家族と面会していただけます。	 主治医に確認後、リハビリが始まります。許可が出れば歩行も可能です。
清潔	 洗髪をするかシャワーに入っています。	 除毛は手術室でします。			 身体拭き・陰部洗浄を行います。
注意事項		 急患その他の事情により遅れる場合があります。		 ベッド上安静です。身体を動かしたい場合はナースコールでお知らせ下さい。	 病状により経過は異なります。ご質問などありましたら遠慮なく病棟看護師までお申し付けください。

		2日後	3日後	4日後	5日後	6日後
食事		 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。	 病院食を食べていただきます。
内服薬	1					
	2					
注射	1	 点滴はありますが、食事の摂取状況により中止になる可能性があります。抗生剤が1日2回あります。	 点滴はありますが、食事の摂取状況により中止になる可能性があります。抗生剤が1日2回あります。	 点滴はありますが、食事の摂取状況により中止になる可能性があります。抗生剤が1日4回あります。		 頭部CT確認後に点滴の針を抜きます。
	2					
検査	1				 採血があります。	
	2				 頭部CTがあります。	
処置	1		 医師により創部を確認します。			 医師により創部の抜糸・抜鉤をします。
	2					 医師により創部を確認します。
	3	 一般病棟では1日に4回血圧などを測ります。				
	4					
安静度		 2日目以降、安静度はリハビリに準じます。				
清潔		 身体拭き・陰部洗浄を行うことがあります。	 身体拭き・陰部洗浄を行うことがあります。	 身体拭き・陰部洗浄を行うことがあります。	 身体拭き・陰部洗浄を行うことがあります。	 身体拭き・陰部洗浄を行うことがあります。
注意事項						